Fraises sol et hors-sol

Mode d'emploi

	STADE	FORMULATION	DOSE	FREQUENCE	REMARQUE
	1 Jeunes plants (repiquage)	TRIANUM-G *ou*	750 g / m^3 de substrat	1 x	Mélangé au substrat
		TRIANUM-P	1.5 g / m² *2.5 à 5 L bouillie par m²*	1 x	Pulvérisation ou mouillage du substrat
HORS-SOL	**2 Plantation**	TRIANUM-P	15 g / 1000 plants *soit 1,8 kg / ha**	1 x	Par irrigation * base 12 plants / m2
	3 Culture Établie	TRIANUM-P	15 g / 1000 plants *soit 1,8 kg / ha**	**Toutes les 10 à 12 semaines**	Par irrigation Une semaine avant floraison * base 12 plants / m2
SOL	**2 Plantation**	TRIANUM-G *ou*	1 g / plant	1 x	A appliquer entre le plant et le sol avant plantation
		TRIANUM-P	30 g / 1000 plants *soit 1,2 kg / ha***	1 x	Par irrigation ** base 4 plants / m2
	3 Culture établie	TRIANUM-P	15 g / 1000 plants *soit 0,6 kg / ha***	**Toutes les 10 à 12 semaines**	Par irrigation Une semaine avant floraison ** base 4 plants / m2

Trianum-P AMM N° 2090169 • Trianum-G AMM N° 2090168.
Composition : Trichoderma harzianum Rifai T-22 1.15% du poids total • Classement Xn - R37, R42/43 - S22, S36/37 - SP1.
Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.
Novembre 2009.

KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

Trianum
Stimulateur de la vitalité des plantes

Siège social 147, Avenue des Banquets • 84300 Cavaillon • Tél. : 04 90 78 30 13 • Fax : 04 90 78 25 98
info@koppert.fr • www.toutsurtrianum.fr